

จังหวัดร้อยเอ็ด

ร่วมรณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด

“อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด”

“ทารกเกิดก่อนกำหนดส่วนใหญ่ที่ควรก่อนกำหนด จะได้รับการดูแลต่อเนื่องในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานาน”

1. ทารกที่มีโรคปอดเรื้อรัง บางรายต้องใช้เครื่องให้ออกซิเจน ตลอดเวลาอย่างน้อย 6 เดือน ถึง 2 ปี
2. ทารกมีโรคจอตาเจริญเติบโตผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนด ทำให้เสี่ยงต่อการมีสายตาเลือนรางหรือตาบอด
3. ทารกมีภาวะเลือดออกในโพรงสมองอาจมีผลต่อพัฒนาการ และการเจริญเติบโต
4. หากทารกเป็นโรคจำใจใส่เน่าเปื่อยและได้รับการผ่าตัดเอาไส้เล็กส่วนตายออกไป อาจไม่สามารถกินนมได้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง

“อาการข้างต้นมักพบได้ในทารกเกิดก่อนกำหนด ที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2,000 กรัม”



จังหวัดร้อยเอ็ด

ร่วมรณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด

“ฝากครรภ์ก่อนคลอดภัยกว่า”

หากสงสัยว่าตั้งครรภ์
ควรเข้ามาฝากครรภ์ทันทีที่ทราบ
หรือภายใน 12 สัปดาห์แรก

เพื่อให้แพทย์ค้นหาความเสี่ยง และความเจ็บป่วยในสตรีตั้งครรภ์

“หากมาช้ากว่าอายุครรภ์ 20 สัปดาห์”
จะมีผลต่อการคำนวณอายุครรภ์ผิดพลาดไม่สามารถ
กำหนดอายุครรภ์เมื่อครบ 37 สัปดาห์ได้ถูกต้อง
และโอกาสที่จะได้รับการดูแลรักษาโรค
หรือภาวะแทรกซ้อนจะ “ล่าช้า” ออกไปด้วย



กำหนดวันคลอดที่แน่นอน ✓

ค้นหา และแก้ไขความเสี่ยง ✓



จังหวัดร้อยเอ็ด

ร่วมรณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด

“สื่อให้ความรู้”

1. อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
2. ฝากครรภ์ก่อนคลอดดีกว่า
3. ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่
4. สัญญาณเตือนคลอดก่อนกำหนดเรียนรู้

